

QK329


.B6

Boller, A Adolf

Zur flora der grossen Kapela

QK329

.B6



Boller A. A., zur Flora der grossen
Kapele i. Verhandlungen d. k. k.
zoolog. - botan. Gesellschaft Wien,
Jahrg. 1892, XLII. Bd., Wien 1893,
p. 241 ff.

Boller A. A., Eine botan. Wanderung
um Bihać i. Bosnien u. im an-
grenzenden Theile v. Croatien i.
Verh. d. k. k. zoolog. botan. Ges.
Wien, Jahrg. 1892, XLII. Bd.,
Wien 1893 p. 250 ff.





Letter B. D. für den Herrn
König v. Preussen
König. Hof. Gesellschaft
Jahrg. 1892, I. II. III. IV. V. VI.
S. 111 ff.

Letter B. D. für den Herrn
König v. Preussen
König. Hof. Gesellschaft
Jahrg. 1892, I. II. III. IV. V. VI.
S. 111 ff.

Zur Flora der grossen Kapela.

Von

A. Adolf Boller.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. Mai 1892.)

Das Hauptgebirge Croatiens — die grosse Kapela — erreicht in seinem nördlichsten Theile, der Bëla Lazica (1533 *m*), seine höchste Erhebung.

In der mir bekannten Literatur über die croatische Flora finde ich wenige Standorte angegeben, die auf diesen Theil des mächtigen Gebirgszuges Bezug nehmen und da die Flora des benachbarten Klek (1182 *m*) bei Ogulin die herrlichste der Umgebung ist, so vermuthete ich, dass die spärlichen floristischen Angaben in der diesbezüglichen Literatur ihre Ursache wohl nur in einer noch nicht genügenden Durchforschung der allerdings schwer zugänglichen Bëla Lazica haben konnten. Umsoweniger konnte ich mir den Mangel an Standortsangaben erklären, als doch geographische Lage, geognostische Bedingungen und die Erhebung in die alpine Region mit dem Klek übereinstimmen.

In folgenden Aufzeichnungen gebe ich das Resultat mehrfacher Excursionen, die ich in den Jahren 1886—1888 von Jasenak und Tuk bei Mrkopalj aus in diesen mächtigen Gebirgsstock unternahm, zur Kenntniss.

In der Nomenclatur und Schreibweise der Localitäten bin ich der im k. k. militär-geographischen Institute in Wien erscheinenden Specialkarte (Massstab 1:75.000) gefolgt, einerseits weil die Excursionen mit Hilfe dieses Kartenwerkes durchgeführt wurden und mir kein besseres bekannt ist, andererseits weil die Benennungen der Oertlichkeiten nach dem im Volksmunde herrschenden Gebrauche eine unzuverlässige und nur allzu verschiedene ist.

Die Bëla Lazica erhebt sich von dem Orte Jasenak an der Rudolfstrasse sehr steil bis zur Höhe von 1533 *m* und erstreckt sich von diesem dominirenden Punkte in nordwestlicher Richtung als kahler Felsengrat in einer beiläufigen Längenausdehnung von 10—12 *km* bis gegen Begovorazdolje hin.

Die höher gelegenen Hänge dieses Gebirges sind besonders gegen Nordosten vielfach von steilen Felswänden gebildet und von tiefen, wilden Rissen und Schluchten unterbrochen, die unteren Theile sind minder durchschnitten und steil, und urwaldartig mit Eichen, Buchen und Fichten bewachsen.

Der ganze Complex bildet eine circa 40 km² umfassende Wildniss, in der jede menschliche Ansiedlung mangelt.

Die systematische Aufzählung der beobachteten und gesammelten Pflanzen möge hier mit der Bemerkung folgen, dass ubiquäre und allgemein in Croatien vorkommende Pflanzen weggelassen wurden und dass ich in Bezug auf die Nomenclatur, die Autorencitation und Artenumgrenzung dem *Conspectus florae Europae* von Nyman gefolgt bin.

Clematis Flammula L. Auf einem Felsen am Fusse des Kolmasac bei Jasenak an einer einzigen Stelle in nur wenigen Exemplaren.

Atragene alpina L. Am Grat der Bëla Lazica häufig.

Thalictrum galioides Nestl. Auf Wiesen bei Jasenak längs des Jasenački potok.

Ranunculus aconitifolius L. In allen Schluchten und Wäldern der Bëla Lazica verbreitet und bis in die Thäler hinabsteigend.

Ranunculus cassubicus L. Unter Wiesengebüsch im Thale von Jasenak.

Ranunculus lanuginosus L. In allen Wäldern bei Jasenak und Tuk.

Helleborus viridis L. Waldränder, grasige Orte bei Jasenak, Vrelo, Tuk und Mrkopalj.

Helleborus niger L. Bëla Lazica in Wäldern.

Helleborus atrorubens K. Wälder am Fusse der Bëla Lazica (Draga poljana der Specialkarte).

Aquilegia vulgaris L. Grasplätze und buschige Hügel bei Jasenak; Abhänge bei Begovorazdolje in einer zierlichen und kleinblüthigen Form (etwa f. *micrantha* Uechtr.?).

Aconitum Anthora L. In den höher gelegenen Waldpartien der Bëla Lazica.

Aconitum paniculatum Lam. Höchste Orte der Bëla Lazica; zahlreich.

Epimedium alpinum L. Unter Buschwerk, auf Hügeln und Abhängen bei Tuk und Mrkopalj verbreitet.

Corydalis lutea DC. Felsen am Aufstiege zur Bëla Lazica.

Corydalis ochroleuca St. In Felsspalten der Bëla Lazica, in Gesellschaft mit *Asplenium viride* Huds. und *Linaria cymbalaria* Mill.

Nasturtium hippicense DC. Berghänge, sonnige Orte und Felder bei Vrelo und Mrkopalj.

Turritis glabra L. An dem Zaune eines Grasgartens in Jasenak.

Dentaria enneaphyllos L. In allen Wäldern verbreitet.

Dentaria trifolia W. K. Schattige Waldstellen der Bëla Lazica.

Dentaria bulbifera L. Bei Jasenak und Begovorazdolje unter Gebüsch an mehreren Orten.

Hesperis matronalis L. Unter Wiesengebüsch am Jasenački potok; spärlich.

Erysimum odoratum Ehrh. Abhänge der Bëla Lazica.

Erysimum odoratum Ehrh. var. *dentatum* (Blätter gezähnt). Mit der typischen Form; vereinzelt.

Erysimum canescens Roth. Felsige Stellen auf allen Bergen um Jasenak.

Conringia orientalis DC. Unter der Saat bei Mrkopalj in wenigen Individuen.

- Lunaria rediviva* L. In Waldschluchten der Běla Lazica.
- Berteroa incana* DC. Strassenrand vor Jasenak.
- Peltaria alliacea* L. Bei der Mühle von Vrelo an feuchten Felshängen.
- Iberis amara* L. Bei Jasenak unter der Saat.
- Aethionema saxatile* R. Br. Felsige Orte der Běla Lazica.
- Helianthemum vulgare* Gaertn. var. *grandiflorum* Wk. Mit der typischen Form an grasigen Orten der Běla Lazica.
- Helianthemum Fumana* Mill. Hügel bei Jasenak.
- Polygala nicaeensis* Risso. Běla Lazica (blaublühend).
- Silene livida* Willd. Běla Lazica.
- Silene italica* Pers. Buschige Orte bei Jasenak.
- Silene dichotoma* Ehrh. In wenigen Individuen auf Wiesen im Thale von Jasenak.
- Silene Schlosseri* Vuk. Běla Lazica.
- Saponaria officinalis* L. Mit gefüllten Blüten in einer ziemlich bedeutenden Gruppe an der Strasse bei Jasenak.
- Tunica saxifraga* Scop. Trockene Abhänge der Krěka kosa bei Jasenak.
- Dianthus barbatus* L. In Wäldern bei Jasenak, auf der Běla Lazica und bei Mrkopalj.
- Dianthus compactus* Kit. Běla Lazica.
- Dianthus croaticus* Borb. Běla Lazica.
- Dianthus silvestris* Wulf. Am Grat der Běla Lazica in zahlreichen Gruppen.
- Cerastium decalvans* Vuk. In Wäldern am Aufstiege zur Běla Lazica.
- Cerastium glutinosum* Tr. Sterile Orte bei Jasenak.
- Stellaria nemorum* L. In Wäldern bei Begovorazdolje und in allen Wäldern bei Jasenak und der Běla Lazica.
- Moehringia muscosa* L. In Felsspalten am Grat der Běla Lazica zahlreich.
- Linum angustifolium* Huds. Abhänge bei Tuk.
- Linum gallicum* L. Auf der Běla Lazica an mehreren Orten häufig.
- Hibiscus Trionum* L. Auf Erdanschüttungen bei Jasenak.
- Malva moschata* L. Auf Wiesen bei Mrkopalj und Tuk.
- Althaea hirsuta* L. Bei Jasenak.
- Hypericum veronense* Schrank. Auf Abhängen überall verbreitet.
- Hypericum Richeri* Vill. Am Grat der Běla Lazica, spärlich.
- Hypericum humifusum* L. Felder bei Begovorazdolje.
- Acer opulifolium* Vill. In einer Schlucht der Běla Lazica in mehreren prächtigen Exemplaren; wohl auch anderwärts.
- Geranium phaeum* L. Wiesen bei Jasenak.
- Geranium pratense* L. Eine ganze Gruppe weissblühend bei Tuk.
- Geranium lucidum* L. Felsige Hänge bei Begovorazdolje.
- Geranium Robertianum* L. var. *purpureum* Gaud. In Wäldern der Běla Lazica vereinzelt mit der typischen Form.
- Staphylea pinnata* L. In Wäldern verbreitet, doch nirgends zahlreich.
- Euonymus verrucosus* Scop. In Wäldern bei Jasenak, selten.

- Rhus Cotinus* L. Felsige Stellen der Bëla Lazica; auch auf Abhängen bei Begovorazdolje.
- Genista germanica* L. Bëla Lazica und sonst verbreitet.
- Genista silvestris* Scop. Buschige und grasige Orte der Bëla Lazica.
- Genista sagittalis* L. Häufig auf Hügeln und Abhängen bei Mrkopalj und Tuk.
- Ononis hircina* Jacq. Bei Vrelo auf Grasplätzen.
- Anthyllis tricolor* Vuk. Bei Mrkopalj.
- Anthyllis polyphylla* Kit. Bëla Lazica.
- Anthyllis Dillenii* Schult. Bëla Lazica.
- Medicago carstiensis* Wulf. Am Debeli vrh bei Jasenak.
- Trifolium patens* Schreb. Buschige Hügel bei Begovorazdolje.
- Trifolium hybridum* L. Wiesen bei Jasenak.
- Trifolium fragiferum* L. Bei Begovorazdolje und nächst Mrkopalj.
- Trifolium medium* L. Mit weissen Blüthen bei Tuk.
- Dorycnium decumbens* Jord. Trockene Hügel bei Begovorazdolje.
- Arthrobium scorpioides* DC. Grasige Orte bei Mrkopalj, häufig.
- Tetragonolobus siliquosus* Roth. Wiesen bei Jasenak.
- Galega officinalis* L. Strassenränder und Gräben bei Mrkopalj und Jasenak.
- Epilobium montanum* L. In allen Wäldern der Bëla Lazica.
- Epilobium roseum* Retz. Bei Tuk.
- Circaea intermedia* Ehrh. und
- Circaea alpina* L. Zusammen in den Wäldern der Bëla Lazica.
- Myricaria germanica* Desv. Im Wiesengebüsche am Jasenački potok bei Jasenak.
- Paronychia imbricata* Rehb. An Felsen des Grates der Bëla Lazica.
- Sempervivum hirtum* L. Bëla Lazica.
- Saxifraga aizoon* Jacq. Bëla Lazica gemein.
- Saxifraga granulata* L. Grasige Abhänge bei Tuk.
- Saxifraga petraea* L. Höchste Orte der Bëla Lazica.
- Saxifraga cuneifolia* L. Bëla Lazica.
- Saxifraga rotundifolia* L. Ueberall um Jasenak, Vrelo, Tuk und Mrkopalj.
- Laserpitium latifolium* L. Höher gelegene Orte der Bëla Lazica.
- Orlaya platycarpus* K. Bei Mrkopalj, selten.
- Torilis heterophylla* Guss. Bëla Lazica, selten.
- Cnidium apioides* Spr. In der Nähe des Unterkunfthäuses Javornica südlich Jasenak.
- Seseli Hippomarathrum* L. Bëla Lazica.
- Seseli leucospermum* W. K. Bëla Lazica.
- Anthriscus fumarioides* Spr. Bëla Lazica, selten.
- Bupleurum junceum* L. Bei Jasenak nicht häufig.
- Bupleurum aristatum* Bartl. Bei Mrkopalj.
- Eryngium alpinum* L. Am Grat der Bëla Lazica häufig. (Hier auch eine auf fallende weisse Form, ohne jeglicher Amethystfärbung, in vielen Exemplaren vermischt mit der typischen Form.)
- Eryngium amethystinum* L. Bei Mrkopalj an der Strasse.

Astrantia croatica Tom. Wälder bei Jasenak am Wege zum Aufstieg zur Běla Lazica.

Hiacquetia Epipactis DC. In Gesellschaft mit *Allium ursinum* L. in den höher gelegenen Waldpartien der Běla Lazica.

Sambucus racemosa L. Waldlichtungen um Jasenak.

Galium divaricatum Lam. Abhänge des Vk. Javornica südlich Jasenak.

Galium pedemontanum All. Běla Lazica.

Valeriana angustifolia Tsch. In Wäldern bei Jasenak.

Valeriana tripteris L. Bei Begovorazdolje nicht selten.

Valeriana tuberosa L. Běla Lazica.

Scabiosa graminifolia L. Běla Lazica.

Scabiosa ochroleuca L. Hügel bei Tuk nächst Mrkopalj.

Scabiosa Scopoli Lk. Běla Lazica, spärlich.

Scabiosa lucida Vill. Häufig bei Begovorazdolje nächst Mrkopalj.

Cephalaria transsylvanica Schrad. Běla Lazica. Auch bei Tuk an Waldrändern.

Doronicum austriacum Jacq. In allen Wäldern um Jasenak und an tiefer gelegenen Orten der Běla Lazica.

Ptarmica vulgaris DC. Am Jasenački potok nächst Vrelo unter Gebüsch.

Achillea magna L. Běla Lazica.

Achillea lanata Spr. Ebendasselbst.

Achillea nobilis L. An der Strasse bei Jasenak; in einem Steinbruche bei Mrkopalj.

Leucanthemum pallens DC. Unter dem Grat der Běla Lazica.

Pyrethrum cinerariaefolium Trev. Běla Lazica, selten.

Artemisia Absinthium L. Bei Mrkopalj.

Artemisia camphorata Vill. Auf Abhängen des Krčka kosa bei Jasenak.

Gnaphalium norvegicum Gunn. Holzschläge bei Jasenak.

Filago gallica L. Abhänge und sterile Orte bei Tuk.

Telekia speciosa Bmg. In allen Thälern und auf Waldlichtungen gruppenweise.

Micropus erectus L. Bei Jasenak häufig.

Petasites albus G. In den Schluchten der Běla Lazica.

Echinops Ritro L. Sterile Abhänge des Samar vrh, südlich von Begovorazdolje.

Carlina simplex W. K. Bei Jasenak häufig.

Onopordon illyricum L. An der Strasse im Orte Jasenak ein mächtiges Exemplar.

Cirsium heterophyllum All. In den höher gelegenen Theilen der Běla Lazica.

Carduus alpestris W. K. Auf der Běla Lazica.

Jurinea mollis Rehb. Bei Mrkopalj auf sterilen Abhängen der Celimbaša und Glavica.

Serratula radiata MB. Bei Tuk, selten.

Centaurea axillaris W. Běla Lazica.

Centaurea rupestris L. Běla Lazica.

Hieracium barbatum Tsch. Auf der Běla Lazica.

Hieracium racemosum W. K. Am Mali Stertič, östlich von Begovorazdolje.

Hieracium lanatum W. K. Běla Lazica.

- Hieracium aurantiacum* L. Bei Tuk und bei Jasenak auf buschigen Hängen.
Picris laciniata Schk. An der Strasse vor Jasenak.
Aposepis foetida DC. In allen Wäldern um Mrkopalj und Jasenak.
Campanula alpina Jacq. Am Grat der Běla Lazica.
Campanula glomerata L. Bei Begovorazdolje und Mrkopalj häufig.
Campanula bononiensis L. Auf grasigen Hängen bei Vrelo nächst Jasenak.
Campanula Waldsteiniana R. S. Běla Lazica.
Phyteuma betonicaefolium Vill. Běla Lazica, selten.
Phyteuma pauciflorum L. Běla Lazica.
Erica carnea L. Běla Lazica.
Rhododendron hirsutum L. Běla Lazica.
Moneses grandiflora Slsb. In Wäldern bei Tuk und Mrkopalj.
Vincetoxicum laxum G. G. Abhänge und buschige Orte bei Jasenak.
Gentiana cruciata L. Um Mrkopalj häufig.
Gentiana pneumonanthe L. Wiesen bei Jasenak. (Auch mit weissen Blüthen.)
Gentiana asclepiadea L. In allen Wäldern bei Mrkopalj, Begovorazdolje, Jasenak, sowie auf der Běla Lazica verbreitet.
Calystegia silvatica W. K. Gebüsch an den Hängen der Berge bei Jasenak.
Heliotropium europaeum L. Sterile Orte und Abhänge bei Mrkopalj.
Borago officinalis L. Wegränder bei Jasenak.
Pulmonaria mollis Wolff. Unter Gebüsch am Jasenacki potok und an Waldrändern bei Vrelo.
Cerinthe aspera Rth. Bei Tuk.
Echium Wierzbickii Rb. Bei Mrkopalj.
Lithospermum purpureo-coeruleum L. Auf einem sterilen Abhänge des Grbin vrh südlich von Jasenak.
Myosotis alpestris Schm. Běla Lazica. Am Višnjevica bei Mrkopalj.
Cynoglossum montanum Lam. Běla Lazica.
Omphalodes verna Meh. Unter Gebüsch bei Tuk.
Scopolia carniolica Jacq. In Schluchten der Běla Lazica.
Atropa Belladonna L. Wälder bei Jasenak, selten.
Verbascum thapsiforme Schrad. Bei Mrkopalj.
Verbascum Blattaria L. Ebendasselbst.
Verbascum thapsiformi-blattaria Döll. Unter den Eltern. (Stimmt mit einem in meinem Herbar erliegenden Original-Exemplare Döll's vollständig überein.)
Verbascum orientale M. B. Bei Jasenak.
Scrophularia laciniata W. K. In Felsspalten an den höchsten Orten der Běla Lazica.
Scrophularia Scopolii Hpe. Wälder bei Jasenak am Aufstieg zur Běla Lazica.
Digitalis ambigua Murr. Unter Gebüsch und in Wäldern bei Mrkopalj und Jasenak.
Linaria genistaefolia Mill. Bei Jasenak nicht selten.
Linaria cymbalaria Mill. An Felsen der Běla Lazica.

- Linaria alpina* Mill. Bëla Lazica, selten.
Veronica urticaefolia Jacq. In allen Wäldern bei Jasenak und der Bëla Lazica.
Veronica saxatilis Scop. Bëla Lazica.
Veronica persica Poir. Grasplätze bei Begovorazdolje.
Euphrasia nemorosa Fr. Bei Mrkopalj auf Grasplätzen.
Euphrasia Salisburgensis Funck. Hänge der Bëla Lazica.
Melampyrum barbatum W. K. Bei Tuk.
Orobanche caryophyllacea Sm. Abhänge bei Jasenak.
Teucrium flavum L. Buschige Orte bei Mrkopalj.
Teucrium montanum L. Bei Jasenak; auf der Bëla Lazica.
Salvia glutinosa L. Wälder und Schluchten der Bëla Lazica.
Salvia aethiopsis L. Bei Vrelo.
Prunella laciniata L. Bei Jasenak überall zahlreich.
Melittis melissophyllum L. In allen Wäldern.
Melittis melissophyllum L. var. *ramosa* Freyn. Im Walde bei Jasenak nächst dem Unterkunftshaus Javornica. An diesem Orte sammelte ich auch mehrere Exemplare mit weissen Blüthen, vielleicht *Melittis albida* Guss.
Stachys alpina L. Auf der Bëla Lazica sehr verbreitet.
Stachys suberenata Vis. Auf Karstboden bei Mrkopalj; auf sonnigen Abhängen bei Tuk. (In Croatien ziemlich verbreitet.)
Sideritis romana L. Bëla Lazica.
Calamintha grandiflora Mch. In allen Wäldern bei Jasenak und am Aufstiege zur Bëla Lazica.
Calamintha alpina Lam. Bëla Lazica.
Satureja illyrica Host. Höher gelegene Hänge der Bëla Lazica.
Soldanella montana W. und
Soldanella alpina W. Beide in Wäldern der Bëla Lazica.
Primula suaveolens Bert. Bëla Lazica.
Androsace villosa L. Bëla Lazica.
Globularia Willkommii Nym. Bei Jasenak.
Globularia nudicaulis L. Bëla Lazica.
Amarantus viridis L. Bei Mrkopalj.
Rumex alpinus L. Bëla Lazica.
Rumex obtusifolius Wallr. Nächst Jasenak.
Polygonum Bistorta L. Wiesen bei Jasenak.
Polygonum alpinum All. Bëla Lazica, selten.
Polygonum arenarium W. K. Bei Mrkopalj, selten.
Daphne Laureola L. Wälder bei Tuk und Begovorazdolje.
Daphne Cneorum L. und
Daphne Mezereum L. Beide in Wäldern der Bëla Lazica.
Thesium intermedium Schrad. Bei Tuk.
Thesium divaricatum Jan. Bëla Lazica.
Aristolochia Clematitis L. Bei Jasenak gemein.
Mercurialis ovata Sternb.-Hpe. In den Wäldern zum Aufstiege zur Bëla Lazica.

- Euphorbia epithymoides* L. Auf Hügeln, Abhängen und Grasplätzen bei Jasenak, Mrkopalj und Tuk häufig.
- Euphorbia dulcis* L. Wälder bei Jasenak und Begovorazdolje.
- Euphorbia fragifera* Jan. Bei Mrkopalj.
- Quercus pedunculata* Ehrh.
- Quercus sessiliflora* Slab.
- Quercus lanuginosa* Th. Bilden Bestandtheile der Wälder der Béla Lazica.
- Salix pentandra* L. Béla Lazica.
- Salix herbacea* L. Béla Lazica.
- Abies excelsa* Poir. und
- Abies alba* Mill. Bilden Bestandtheile der Wälder der Béla Lazica.
- Juniperus nana* W. An den höchsten Orten der Béla Lazica.
- Cypripedium calceolus* L. Buschige Abhänge bei Mrkopalj.
- Corallorhiza innata* Br. Bei Jasenak, selten.
- Listera cordata* Br. Béla Lazica.
- Orchis sambucina* L. Bei Jasenak (gelb und purpurn blühend).
- Orchis laxiflora* Lam. var. *palustris* Jacq. Auf Wiesen bei Jasenak.
- Platanthera solstitialis* Rehb. Wälder der Béla Lazica.
- Crocus albiflorus* Kit. Bei Tuk.
- Narcissus poeticus* L. Auf Wiesen bei Jasenak.
- Narcissus Pseudo-Narcissus* L. Bei Mrkopalj.
- Leucojum aestivum* L. Grasige Abhänge bei Begovorazdolje.
- Asparagus tenuifolius* Lam. Unter Gebüsch bei Vrelo nächst Jasenak.
- Tamus communis* L. Im Gebüsch auf Hängen der Béla Lazica.
- Hemerocallis flava* L. Wiesen bei Jasenak.
- Asphodelus albus* W. Bei Tuk.
- Lilium bulbiferum* L.
- Lilium Martagon* L. Beide auf der Béla Lazica.
- Erythronium dens canis* L. Ueberall um Mrkopalj und Jasenak in Wäldern.
- Ornithogalum pyrenaicum* L. Unter der Saat bei Jasenak.
- Ornithogalum umbellatum* L. Béla Lazica auf grasigen Hängen.
- Allium rotundum* L. Bei Tuk.
- Allium sphaerocephalum* L. Bei Jasenak.
- Allium roseum* L. Auf der Béla Lazica.
- Allium ursinum* L. In Wäldern der Béla Lazica zahlreich.
- Colchicum pannonicum* Grsb. Auf Wiesen bei Tuk.
- Luzula albida* DC. Bei Jasenak in Holzschlägen.
- Luzula Forsteri* DC. Bei Tuk.
- Arum maculatum* L. Am Jasenački potok unter Gebüsch.
- Cyperus longus* L. Strassengraben vor Jasenak.
- Cyperus Monti* L. Béla Lazica.
- Scirpus radicans* Schk. Bei Jasenak.
- Carex silvatica* Huds. Wälder bei Jasenak und der Béla Lazica.
- Carex distans* L. Bei Mrkopalj.

- Carex fuliginosa* Schk. Běla Lazica.
Carex ferruginea Scop. Běla Lazica.
Carex Halleriana Asso. Bei Mrkopalj, selten.
Carex Schreberi Schrank. Bei Tuk und Begovorazdolje.
Chrysopogon Gryllus Trin. Abhänge bei Mrkopalj.
Phleum alpinum L. Běla Lazica.
Calamagrostis varia P. B. Bei Jasenak.
Agrostis alpina Sep. Běla Lazica.
Festuca heterophylla Lam. Bei Tuk.
Festuca sulcata Haek. Bei Jasenak häufig.
Festuca glauca Lam. Běla Lazica.
Festuca vaginata Kit. Běla Lazica.
Poa alpina L. Běla Lazica.
Elymus europaeus L. Grasige Abhänge bei Mrkopalj.
Blechnum Spicant Rth. In allen Wäldern bei Jasenak und Mrkopalj.
Scolopendrium vulgare Sym. Ueberall auf steinigen Hängen und in Felsspalten
 der Běla Lazica.
Asplenium Adiantum nigrum L. Unter Gebüsch bei Jasenak.
Asplenium germanicum Weis. Běla Lazica, selten.
Asplenium viride Huds. f. *typica*. In Felsspalten am Aufstiege zur Běla Lazica.
Polypodium vulgare L. var. *serratum*. Bei Jasenak.
Ceterach officinarum W. An alten Strassenmauern bei Jasenak.

Eine botanische Wanderung um Bihač in Bosnien und im angrenzenden Theile von Croatien.

Von

A. Adolf Boller.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. Mai 1892.)

Ich benützte mehrere längere Urlaube, um jenes Alpengebirge Croatiens zu besuchen, welches sich von dem ziemlich bedeutenden Orte Petrovoselo in süd-östlicher Richtung erhebt, sich hart an der croatisch-bosnischen Landesgrenze hinzieht, mit dem Namen Plješevica planina benannt ist, und mit der Gola Plješevica — 1649 *m* — den höchsten Punkt erreicht.

Von diesem Gebirge aus genießt man nach Osten einen herrlichen Ausblick in das Thal der Una und in die Niederung von Bihač, und da Zeit, Wetter und Umstände es gestatteten, so nahm ich stets auch meine Wege dahin und benützte meine wiederholten mehrtägigen Aufenthalte in Bihač dazu, mich in dessen Umgebung in floristischer Beziehung zu orientiren.

Bihač ist ein freundliches, am Unaflusse gelegenes, im Aufblühen begriffenes Städtchen, mit Post- und Telegraphenverbindung, guten Strassen und leidlichen Unterkünften, so dass es sich für eine Durchforschung des unteren Unathales als Ausgangsstation sehr gut eignet.

Hart am Fusse der Plješevica planina ist die Landesgrenze zwischen Croatien und Bosnien gezogen. Das eben genannte Alpengebirge fällt nach Osten von seiner bedeutenden Höhe sehr steil ab. Bihač liegt vom Fusse der Plješevica planina etwa 6 *km* entfernt.

Betritt man Nordbosnien von dieser Seite, so ist wohl kaum an anderer Stelle der Wechsel des Vegetationsbildes ein so plötzlicher und unvermittelter als hier; während die herrliche alpine Flora der Plješevica planina in Vielem an die Flora der Berge Tirols mahnt, treten wir abwärts steigend mit einem Male in das ausgesprochenste Vegetationsbild des Karstes, und nur an wenigen Stellen der Niederung von Bihač finden wir einige Vertreter der alpinen Flora, die aus ihren Höhen durch Elementarereignisse herabgeführt wurden.

Das Terrain, das ich auf 15 Excursionen von Bihač aus besuchte, begrenzt sich gegen Norden etwa mit dem Orte Ostrožac im Unathale; nach Westen durch den Ostabfall der Plješevica planina; im Süden durch die Ortschaften Medjudražje, Skočaj und Ripac und im Osten durch die Linie Drenovo-Pass an der Strasse Bihač-Krupa und die Kammlinie der Grmič planina mit ihrer dominirenden Kuppe Gredoviti vrh mit 1209 m Höhe.

Nomenclatur und Schreibweise der Oertlichkeiten ist nach der im k. und k. militär-geographischen Institute in Wien erscheinenden Specialkarte, Massstab 1 : 75.000, angenommen, weil die Excursionen an der Hand dieser Kartenwerke durchgeführt wurden und auch die Notizen auf meinen Ausflügen darnach bewerkstelligt worden sind.

Ich bemerke, dass 15 Excursionen in dem wechsellvollen und theilweise schwierig zu betretenden Terrain der Umgebung von Bihač verschwindend wenig sind, um selbst bei einer so geringen Begrenzung des besuchten Territoriums ein vollständiges Bild der floristischen Verhältnisse zu geben; ich will auch nur dasjenige bieten, was mir der Notirung werth schien und was ich sammelte, um es späterhin determiniren zu können, während ich alle dort zu Lande überall vorkommenden Species weggelassen habe; andererseits kommt jedoch dieser Aufzählung der Umstand zu Gute, dass meine Aufenthalte in Bihač zu verschiedenen Jahreszeiten waren.

In der Nomenclatur, Autorencitation und Artenumgrenzung bin ich Nyman's *Conspectus florae Europae* gefolgt.

Atragene alpina L. Auf Felsen der höchsten Orte des Gredoviti vrh; häufig auf der Plješevica planina.

Clematis recta L. Auf Wiesen im Unathale bei Ripac.

Clematis Viticella L. Unter Gebüsch bei Tihotina.

Thalictrum minus L. var. *virens* Koch. Auf Abhängen der Čurak glava, südlich des Drenovo-Passes.

Anemone hortensis L. Unter Gebüsch im Drenovo-Passe; am Waldrande der Sokolačka glavica bei Sokolač.

Anemone trifolia L. Auf der Plješevica planina.

Adonis autumnalis L. Unter der Saat bei Bihač.

Adonis vernalis L. Auf Abhängen und Hügeln bei Ostrožac.

Batrachium hederaceum Dmrt. In der Una bei Golubić.

Ranunculus aconitifolius L. Auf der Plješevica planina; am Gredoviti vrh in der Grmič planina.

Ranunculus illyricus L. Abhänge bei Bihač; nicht selten.

Ranunculus Villarsii DC. Plješevica planina.

Ranunculus acer \times *lanuginosus*. Unter den Eltern am Waldrande zu Lavalje.

Ranunculus arvensis L. var. *genuinus* Koch. Unter der Saat bei Bihač.

Helleborus niger L. Abhänge der Plješevica planina.

Isopyrum thalictroides L. Unter Gebüsch im Unathale nächst Spahić.

Nigella damascena L. Unter der Saat bei Sokolač südlich von Bihač; bei Ostrožac.

- Aquilegia platysepala* Rehb. Unter Gebüsch am Mrežnica potok bei Klokot.
- Aconitum Anthora* L. Auf der Plješevica planina und am Gredoviti vrh; an letzterer Localität sehr spärlich.
- Paeonia corallina* Retz. An felsigen Stellen der Grmič planina; auf Abhängen des Gredoviti vrh.
- Epimedium alpinum* L. Abhänge der Grmič planina; unter Gebüsch auf den Gradinahöhen.
- Corydalis ochroleuca* St. Auf Felsen der Plješevica planina; an ähnlichen Stellen am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
- Corydalis lutea* DC. Felsen der Plješevica und der Grmič planina.
- Cheiranthus Cheiri* L. Felsige Stellen der Plješevica planina; am Gredoviti vrh.
- Nasturtium amphibium* R. Br.
- Nasturtium terrestre* Tausch.
- Nasturtium palustre* DC. Im Unathal auf Wiesen und am Ufer des Flusses.
- Nasturtium lippicense* DC. An sterilen Orten bei Bihač.
- Arabis croatica* Sch., Nym., Kotsch. Auf der Plješevica planina.
- Cardamine resedifolia* L. Auf der Plješevica planina.
- Cardamine trifolia* L. Am Gredoviti vrh in der Grmič planina und in Wäldern der Plješevica planina.
- Dentaria bulbifera* L. Unter Gebüsch bei Bihač.
- Sisymbrium Columnae* L. Strassenränder bei Kralje.
- Erysimum odoratum* Ehrh. Auf Aeckern nächst Spahić.
- Erysimum canescens* Roth. Felsige Orte im Unathale bei Ostrožac.
- Erysimum helveticum* DC. Auf Abhängen der Plješevica planina.
- Alyssum medium* Host. Am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
- Alyssum montanum* L. Grmič planina.
- Farsetia incana* R. Br. Um Bihač häufig.
- Draba aizoides* L. Auf der Plješevica- und Grmič planina.
- Thlaspi alpestre* L. Felsen des Gredoviti vrh.
- Iberis saxatilis* L. Grmič planina in Felsspalten; nicht häufig.
- Hutchinsia petraea* R. Br. Auf steinigen Hängen des Debeljača, südlich von Bihač.
- Capsella rubella* Reut. Um Bihač mehrfach aufgefunden.
- Aethionema saxatile* R. Br. Auf der Plješevica planina; an steinigen Hängen der Grmič planina.
- Helianthemum vineale* Pers. Steinige Abhänge des Berges Kozjan.
- Polygala nicaensis* Risso. Auf grasigen Hügeln um Bihač verbreitet.
- Polygala comosa* Schk. Bei Bihač (auch mit weissen Blüten).
- Sagina ciliata* Tr. Brachen bei Ripač; sehr spärlich.
- Mochringia mucosa* L. Felsen der Grmič planina; häufig auf der Plješevica planina.
- Stellaria nemorum* L. Häufig in Wäldern der Plješevica und Grmič planina.
- Saponaria officinalis* L. Bei Bihač.
- Vaccaria grandiflora* Fisch. Unter Getreidesaat bei Klokot und Papar.

- Dianthus barbatus* L. Plješevica planina auf allen tiefer gelegenen Hängen.
Dianthus Carthusianorum L. var. *alpestris* Neilr. Plješevica planina.
Dianthus liburnicus Bartl. Grasige Abhänge bei Zavalje.
Dianthus nodosus Tausch. Abhänge der Gradinahöhen südlich Bihać.
Silene italica Pers. Um Bihać an mehreren Orten.
Agrostemma Coronaria L. Steinige Abhänge im Unathale bei Ripač.
Linum gallicum L. Sterile Abhänge des Gredoviti vrh; auf Hügeln bei Papar.
Linum angustifolium Huds. Velika kosa, nördlich des Drenovo-Passes.
Linum flavum L. Unter Buschwerk an den unteren Hängen der Grmič planina.
Malva moschata L. Auf Wiesen um Bihać, hie und da.
Althaea officinalis L. Um Bihać; in der Nähe von Ortschaften, in Grasgärten.
Hibiscus Trionum L. Wüste Orte nächst Veliki Radić an der Strasse Bihać-Krupa.
Hypericum veronense Schrk. Um Bihać häufig.
Hypericum Richeri Vill. Auf der Gola-Plješevica.
Hypericum montanum L. Grmič planina unter Gebüsch.
Acer obtusatum Kit. Abhänge der Plješevica planina, nicht häufig.
Acer monspessulanum L. Abhänge der Gradinahöhe südlich Bihać.
Geranium phaeum L. Unter Wiesengebüsch am Mrežnica potok bei Klokot und Papar.
Geranium silvaticum L. Wälder der Grmič planina.
Geranium rotundifolium L. Abhänge des Grodoviti vrh.
Geranium lucidum L. In Wäldern bei Skočaj, nicht häufig.
Impatiens nolitangere L. Wälder der Plješevica planina.
Tribulus terrestris L. Wegränder bei Ripač im Unathale; bei Veliki Radić.
Ruta divaricata Ten. Bei Skočaj auf Abhängen.
Staphylea pinnata L. In Wäldern der Plješevica planina.
Evonymus verrucosus Scop. Plješevica in Wäldern, selten.
Paliurus australis Gärt. Um Bihać.
Rhus Cotinus L. Hügelgebüsch bei Bihać.
Spartium junceum L. Bei Ripač auf steinigen Abhängen.
Genista sericea Wulf. Felsen des Gredoviti vrh.
Genista silvestris Scop. Sonnige, steinige Hänge der Grmič planina.
Cytisus alpinus Mill. Auf der Plješevica planina.
Cytisus sagittalis Koch. Um Bihać verbreitet.
Ononis hircina Jacq. Grasplätze um Bihać.
Anthyllis polyphylla Kit. Grasige Hänge der Grmič planina.
Medicago prostrata Jacq. β. *declinata* Kit. Mit der typischen Form beim Wach-
 hause in dem Drenovo-Passe.
Medicago carstiensis Wulf. Bei Berani bunari südlich Veliki Radić.
Trifolium striatum L. An Wegrändern bei Bihać.
Trifolium angustifolium L. Abhänge und grasige Orte bei Lavalje.
Trifolium alpestre L. Buschige Orte der Grmič planina.
Trifolium pallidum W. et K. Grasplätze bei Lokovo nächst Skočaj.

- Dorycnium decumbens* Jord. Hügel bei Bihač.
- Galega officinalis* L. Strassengraben an der Strasse Bihač-Krupa.
- Colutea arborescens* L. Tiefer gelegene Hänge der Plješevica planina; auf der Grmič planina.
- Oxytropis pilosa* DC. Sonnige, grasige Stellen des Gredoviti vrh.
- Astragalus illyricus* Bernh. Plješevica planina.
- Spiraea Filipendula* L. Wiesen im Unathale.
- Spiraea Ulmaria* L. Unter Gebüsch am Mrežnica potok nächst Klokot.
- Potentilla hirta* L. Hügel und grasige Abhänge nächst Lohovo bei Skočaj.
- Potentilla inclinata* Vill. Um Bihač.
- Sorbus torminalis* Cr. Auf der Plješevica planina.
- Crataegus nigra* W. K. Plješevica planina; selten.
- Cotoneaster tomentosa* Lindl.
- Cotoneaster vulgaris* Lindl. Beide auf der Grmič planina.
- Epilobium trigonum* Schrk. In Wäldern bei Skočaj.
- Epilobium montanum* L. In allen Wäldern der Plješevica und Grmič planina.
- Lythrum Salicaria* L. Ufer der Una.
- Paronychia argentea* Lam. Plješevica planina; selten.
- Paronychia imbricata* Rehb. Ebendasselbst.
- Sempervivum hirtum* L. Plješevica planina.
- Saxifraga aizoon* Jacq. Grmič planina.
- Saxifraga adscendens* L. Auf der Plješevica planina; am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
- Laserpitium Gaudini* Moret. Plješevica planina. (Kommt auch am Vellebit vor.)
- Peucedanum austriacum* K. Bei Ostrožac im Unathal.
- Peucedanum carvifolium* Vill. Grmič planina; selten.
- Athamantha Matthioli* Wulf. Auf der Plješevica planina.
- Libanotis montana* Cr. Auf Hügeln um Bihač.
- Seseli tortuosum* L. Am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
- Seseli osseum* Cr. und
- Seseli varium* Trev. Beide auf Abhängen der Plješevica planina.
- Chaerophyllum aureum* L. Auf der Sokolačka glavica bei Sokolač im Walde.
- Scandix australis* L. Um Bihač an mehreren Orten.
- Bunium alpinum* W. K. Auf der Plješevica planina.
- Trinia vulgaris* DC. Bei Panjak nächst Vedropolje südlich des Ortes Klokot.
- Bupleurum gramineum* Vill. Hügel bei Veliki Radič.
- Bupleurum aristatum* Bartl. Bei Bihač.
- Bupleurum junceum* L. Nächst Sokolač unter Gebüsch auf Abhängen.
- Eryngium alpinum* L. Am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
- Astrantia major* L. In Wäldern der Grmič planina.
- Haquetia Epipactis* DC. Auf den Hängen der Plješevica planina in Wäldern.
- Lonicera etrusca* Sav. Bei Bihač auf Abhängen, nicht häufig.
- Galium rotundifolium* L. Im Walde der Gradinahöhen südlich Sokolač.
- Galium silvaticum* L. In den Wäldern um Bihač verbreitet.

- Galium ochroleucum* Kit. Am Mali Tubar auf grasigen Abhängen.
Asperula cynanchica L. Hügel und Abhänge nächst Bihač; bei Ostrožac im Unathale unter Gebüsch.
Valeriana tuberosa L. Auf der Plješevica planina.
Valeriana montana L. Ebendasselbst.
Valerianella coronata DC. Ziemlich spärlich bei Ripač im Unathale.
Scabiosa lucida Vill. Unter Gebüsch und auf Hängen bei Bihač.
Scabiosa suaveolens Dsf. Bei Kurtovo selo.
Cephalaria transsilvanica Schrad. In Wäldern der Plješevica planina.
Doronicum austriacum Jacq. Wälder der Grmič planina.
Cineraria alpestris Hpe. Am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
Cineraria aurantiaca Hpe. Auf der Plješevica planina.
Senecio sarracenicus L. Im Unathal unter Gebüsch.
Senecio Fuchsii Gm. In Wäldern der Grmič planina.
Anthemis brachycentros Gay. Bei Bihač.
Ptarmica Clavenae DC. Auf der Gola-Plješevica.
Leucanthemum vulgare Lam. var. *latifolium*. Bei Bihač.
Pyrethrum macrophyllum W. Auf der Plješevica planina.
Gnaphalium norvegicum W. Grmič planina.
Linosyris vulgaris Less. Abhänge bei Ostrožac.
Telekia speciosa Bmg. Auf der Plješevica planina; am Gredoviti vrh in Wäldern.
Micropus erectus L. Um Bihač mehrfach verbreitet.
Echinops Ritro L. Auf einem Abhange bei Klokot.
Carduus defloratus L. Um Bihač.
Carduus collinus W. K. Grmič planina.
Jurinea mollis Rehb. Bei Vedropolje.
Carthamus lanatus L. Bei Bihač an mehreren sterilen Stellen.
Centaurea montana L. Auf Hängen der Grmič planina; auf der Plješevica planina.
Centaurea rupestris L. Abhänge bei Skočaj.
Prenanthes purpurea L. Wälder um Bihač.
Hieracium racemosum W. K. Plješevica planina.
Hieracium barbatum Tsch. Ebendasselbst.
Hieracium aurantiacum L. Am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
Crepis Jacquinii Tsch. Auf der Plješevica planina.
Crepis foetida L. Grmič planina.
Picris laciniata Schk. Bei Ostrožac.
Leontodon incanus Schk. Plješevica planina.
Scolymus hispanicus L. Um Bihač an mehreren Orten.
Aposeris foetida DC. In Wäldern um Bihač nicht selten.
Campanula bononiensis L. Auf Hügeln und auf Abhängen bei Bihač an mehreren Orten.
Edraianthus tenuifolius DC. Bei Bihač.
Erica carnea L. Auf der Plješevica planina und am Gredoviti vrh in der Grmič planina.

- Rhododendron hirsutum* L. Plješevica planina.
Vincetoxicum laxum G. G. Auf grasigen, buschigen Hängen bei Skočaj.
Heliotropium europaeum L. An wüsten Stellen bei Bihač in Gesellschaft mit
Hibiscus Trionum L.
Cerinth aspera Rth. Grmič planina, selten.
Onosma stellulatum W. K. Bei Ostrožac.
Lithospermum purpureo-coeruleum L. Auf einem sterilen Abhänge nächst
 Skočaj.
Omphalodes verna Mch. Unter Gebüsch bei Ripač nächst Bihač.
Hyoscyamus albus L. Auf einem wüsten Platz bei Klokot.
Scopolia carniolica Jacq. Plješevica planina.
Verbascum montanum Schrad. Plješevica planina.
Verbascum Blattaria L. Um Bihač verbreitet.
Verbascum pulverulentum Vill. Grmič planina.
Verbascum nigrum L. Bei Bihač und um Ostrožac.
Scrophularia Scopolii P. Wälder des Gredoviti vrh.
Scrophularia laciniata W. K. Felsen der Plješevica planina.
Antirrhinum Orontium L. Um Bihač an mehreren Orten.
Pedicularis acaulis Scop. Abhänge bei Zavalje; selten.
Orobanch caryophyllacea Sm. Um Bihač ziemlich häufig.
Orobanch Picridis F. W. Schz. Bei Ostrožac auf *Picris laciniata*, selten.
Teucrium Arduini L. Am Gredoviti vrh.
Teucrium Botrys L. Um Bihač nicht selten.
Teucrium montanum L. Grmič planina.
Salvia verticillata L. Auf Wiesen bei Skočaj.
Scutellaria alpina L. Auf der Plješevica planina und am Gredoviti vrh.
Lamium orvala L. Unter feuchtem Gebüsch im Unathale nächst Ostrožac.
Galeobdolon luteum Huds. Unter Gebüsch am Panjački potok nächst Vedropolje.
Stachys alpina L. Grmič planina.
Stachys germanica L. Bei Bihač.
Stachys subcrenata Vis. Auf der Karstebene bei Čekerlije, östlich von Bihač.
Sideritis romana L. Hügel und sterile Abhänge im Drenovo-Passe.
Calamintha grandiflora Mch. In Wäldern der Plješevica planina.
Calamintha officinalis Mch. Grmič planina.
Calamintha alpina Lam. Auf der Plješevica planina und am Gredoviti vrh in
 der Grmič planina.
Satureja illyrica Host. Hänge der Plješevica planina.
Utricularia vulgaris L. In der Una nächst den Mühlen bei Ripač.
Lysimachia nemorum L. In einem lichten Wäldchen bei Skočaj.
Anagallis coerulea Schreb. Bei Bihač.
Soldanella montana W. Am Gredoviti vrh in der Grmič planina und auf der
 Plješevica planina.
Primula elatior L.
Primula acaulis Jacq.

- Primula officinalis* Scop. Alle drei um Bihač verbreitet.
- Primula suaveolens* Bert. Am Gredoviti vrh.
- Globularia Willkommii* Nym. Grmič planina.
- Amarantus retroflexus* L. Bei Klokot an der Ortslisière; bei Ostražac.
- Phytolacca decandra* L. In Gärten bei Bihač angepflanzt und an mehreren Orten verwildert.
- Chenopodium Bonus Henricus* L. In Bihač, Ostrožac, Pokoj verbreitet (wohl in allen Ortschaften).
- Chenopodium Vulvaria* L. An denselben Orten.
- Rumex crispus* L. Um Bihač und im Unathale bei Golubić und Ripač.
- Rumex alpinus* L. Auf der Plješevica planina häufig; auf der Grmič planina.
- Rumex obtusifolius* Wallr. Unathal bei Ostrožac.
- Polygonum Bellardi* All. Bei Sokolač.
- Daphne Mezereum* L. Grmič planina in Wäldern.
- Daphne Laureola* L. Auf der Plješevica planina; selten.
- Asarum europaeum* L. In allen Wäldern um Bihač.
- Aristolochia Clematitis* L. Unter Gebüsch, in verwilderten Grasgärten verbreitet.
- Aristolochia pallida* W. Auf Abhängen bei Hrgar und Ripač.
- Mercurialis perennis* L. Um Bihač häufig.
- Mercurialis ovata* Stbg., Hippe. In Wäldern der Plješevica planina und der Grmič planina.
- Euphorbia fragifera* Jan. Bei Kurtovo selo.
- Euphorbia dulcis* L. In Wäldern der Plješevica planina und des Gredoviti vrh in der Grmič planina.
- Euphorbia epithymoides* Jacq. Um Bihač verbreitet.
- Euphorbia carniolica* Jacq. Wälder der Plješevica planina.
- Euphorbia amygdaloides* L. Gredoviti vrh in tiefer gelegenen Waldungen.
- Euphorbia falcata* L. Auf Aeckern um Bihač.
- Euphorbia chamaesyce* L. Bei Ripač.
- Humulus Lupulus* L. Auf Gebüsch rankend und um Bihač verbreitet.
- Castanea sativa* Scop. Vereinzelt um Bihač.
- Salix fragilis* L. und
- Salix alba* L. Am Unafer.
- Salix incana* Schrk. Unainsel bei Golubić ein Salicetum bildend.
- Salix repens* L. Auf einer Wiese bei Papar.
- Salix herbacea* L. Auf der Plješevica planina und am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
- Salix retusa* L. Auf der Plješevica planina.
- Alnus incana* W. und
- Alnus glutinosa* G. Beide im Unathale.
- Betula verrucosa* Ehrh. Vereinzelt verbreitet.
- Juniperus communis* L. Bei Bihač nicht häufig.
- Juniperus nana* W. Auf der Plješevica planina.
- Butomus umbellatus* L. Ufer der Una oberhalb Ostrožac.

- Potamogeton natans* L. Unaffluss an mehreren Stellen.
Corallorhiza innata Br. Wälder der Plješevica planina.
Cephalanthera rubra Rich. Um Bihač häufig.
Epipactis latifolia All. Wälder um Bihač.
Epipactis atrorubens Schult. Auf der Grmič planina.
Orchis Simia Lam. Abhänge bei Skočaj und Zavalje.
Orchis globosa L. Am Gredoviti vrh.
Orchis Morio L. Auf Wiesen im Unathale.
Orchis sambucina L. Um Bihač verbreitet.
Orchis laxiflora Lam. Auf Wiesen im Unathale; ferner auf Wiesen am Mrežnica potok bei Klokot und Muslićselo.
Orchis pallens L. Abhänge der Grmič planina; selten.
Platanthera chlorantha Cust. In Wäldern der Plješevica planina; auf der Grmič planina.
Platanthera solstitialis Rehb. Ebendasselbst.
Satyrion hircinum L. Auf einem grasigen, buschigen Abhänge bei Lavalje in nur wenigen Individuen.
Gladiolus segetum Ker. Bei Bihač, selten und vereinzelt.
Crocus vernus Wulf. Grasplätze um Bihač.
Crocus albiflorus Kit. Abhänge der Grmič planina.
Narcissus poeticus L. Hie und da auf Grasplätzen; ob wild? Die Pflanze wird in Bauerngärten in der Gegend von Bihač auch cultivirt.
Leucojum aestivum L. Grasige Hänge bei Skočaj.
Majanthemum bifolium Schm. In Wäldern um Bihač.
Tamus communis L. Zwischen Gebüsch auf Abhängen bei Zavalje; auf der Grmič planina.
Anthericum Liliago L. Buschige Hänge nächst dem Drenovo-Passe.
Lilium Martagon L. Wälder der Grmič planina.
Erythronium dens canis L. Auf Grasplätzen und in lichten Wäldern um Bihač verbreitet.
Botryanthus vulgaris Kth. Um Bihač auf Wiesen.
Botryanthus odoratus Kth. Abhänge und grasige Stellen bei Zavalje.
Veratrum album L. und
Veratrum nigrum L. Beide auf der Plješevica planina.
Arum maculatum L. In Wäldern der Grmič planina.
Typha angustifolia L. Unaufer südlich Ripac.
Cyperus longus L. Bei Golubić an einer Stelle zahlreich.
Carex ampullacea Good. Bei Ostrožac.
Carex pendula Huds. Am Gredoviti vrh in der Grmič planina.
Carex distans L. Wälder um Bihač.
Carex montana L. Auf den Gradinahöhen östlich von Skočaj.
Phalaris paradoxa L. Bei Golubić, selten.
Phleum alpinum L. Am Gredoviti vrh; auf der Plješevica planina.
Cynosurus cristatus L. Beim Drenovo-Passe.

- Lasiagrostis Calamagrostis* Lk. Abhänge bei Skočaj.
Piptatherum paradoxum P. B. Grmić planina.
Arrhenatherum avenaceum P. B. Bei Bihač an mehreren Orten.
Avena caryophyllaea W. et Wigg. Um Medjudražje.
Molinia coerulea Mch. Wiesen bei Hrgar, östlich von Ripač.
Festuca montana M. B. Auf der Plješevica planina.
Festuca varia Hke. Grmić planina.
Festuca amethystina L. Gredoviti vrh.
Poa serotina Ehrh. Bei Kosa im Unathale.
Aegilops ovata L. Bei Panjak, nicht häufig.
Brachypodium pinnatum P. B. Um Bihač an mehreren Orten.

Zum Schlusse bemerke ich, dass man viele seltene Pflanzen, die auf der Plješevica planina wachsen, in dieser Aufzählung vermisst; dies hat seinen Grund, weil ich nur die gegen Bihač gelegenen Hänge in Berücksichtigung zog und weil der Zweck dieser Aufzählung nur ist, ein Vegetationsbild von Bihač in Bosnien zu geben; auch ist die Plješevica planina von im Lande ansässigen Botanikern, also von viel berufenerer Seite, bereits mehrfach durchforscht und die „Flora Croatica“ enthält eine Menge Standorte aus diesem Gebiete.

Nachtrag zu vorstehendem Aufsätze.

Im Herbare des Herrn Dr. E. v. Halácsy sah ich vor wenigen Tagen schöne Exemplare einer *Ononis*, die ihm Herr Boller aus der Umgebung von Bihač eingesendet hatte. Die Pflanze stellte sich als die für das Gebiet der Occupationsländer neue *Ononis alopecuroides* L. heraus, deren Auffindung in Bosnien insoferne von grossem Interesse ist, als es sich um eine bisher nur aus dem westlichen Theile des Mediterrangebietes (Portugal, Spanien, Südfrankreich, Unteritalien, Corsica, Sicilien) bekannte, ausserdem für Griechenland angegebene Pflanze handelt.

Wien, 20. Juni 1892.

Dr. R. v. Wettstein.

Geheimrath Dr. Eduard August v. Regel.

Nachruf,

gehalten in der Monatsversammlung am 1. Juni 1892


von

Josef Armin Knapp.

„Fallen sehe ich Zweig auf Zweig“ möchte ich beim Anblicke der furchtbaren Gründlichkeit, mit welcher der unerbittliche Tod unter der botanischen Garde Russlands aufräumt, ausrufen. Während der abgelaufenen letzten drei Jahre verloren wir in rascher Folge Trautvetter, Maximowicz und am 15. Mai 1892 Regel. Unter den Genannten weist Regel die grossartigste Carrière auf, er brachte es als self made man in des Wortes vollster Bedeutung vom Gärtnerlehrlinge bis zur Excellenz und dem Adelstande, er verstand es, die Wissenschaft mit der Praxis zu vereinigen, der Horticulturn, Pomologie und Dendrologie in Russland zu neuen und bis dahin kaum geahnten Erfolgen zu verhelfen, sowie ihm auch die systematische Botanik höchst wichtige Aufschlüsse verdankt. Alles in Allem genommen war Regel eine grossartig und vielseitig veranlagte Individualität, die unwillkürlich an Josef M. Decaisne (geb. 9. März 1807, † 8. Februar 1882) mahnt, welcher letzterem jedoch weit reichlichere Mittel bei seinen Unternehmungen zu Gebote gestanden haben. Die Gärtner aber, aus deren Mitte er hervorgegangen, haben vollends Ursache, auf ihn stolz zu sein, in ihm ein leuchtendes Vorbild für alle Zeiten zu erblicken, welches sie nicht bloss verehren, sondern auch nachzuahmen trachten sollen!

Eduard August Regel wurde am 13. August 1815 zu Gotha als Sohn eines Gymnasialprofessors und Garnisonspredigers L. A. Regel geboren. Schon als Knabe zeigte er eine besondere Liebe zum Gartenbau; er putzte unter Anleitung des alten Gartenarbeiters seines Grossvaters Döring die Obstbäume aus, schnitt dieselben sogar und hielt auch den Garten der Eltern in Ordnung. Das Gymnasium besuchte er bis Secunda und trat 1830 als Gärtnerlehrling in den herzoglichen Orangengarten ein, wo er bis 1833 lernte. Während dieser Zeit bildete er sich weiter aus, Unterricht in der Botanik und Insectenkunde, verbunden mit botanischen Excursionen hatte er beim Oberförster Kellner schon

QR 329 .B6
Boller, A. Adolf/Zur Flora der grossen K



3 5185 00110 0898

